



Форлакс®



Умное слабительное для детей и взрослых! Учит кишечник работать самостоятельно!²

Режим приема для детей:

 от 6 месяцев до года	 от года до 4 лет	 от 4 до 8 лет	 от 8 до 18 лет	
4 г	4 г	4 г	10 г	

Форлакс® 10 г Рег. уд. П N014670/01 от 17.11.08
Форлакс® 4 г Рег. уд. ЛС-002549 от 23.08.10

Необходим курсовой прием от 2–4 недель² до 3 месяцев¹

1 пакетик Форлакса 4 г растворить в 50 мл воды;
1 пакетик Форлакса 10 г растворить в стакане воды.
Принимать однократно утром (если дозировка 1 пакетик в день);
утром и вечером (если дозировка более 1 пакетика в день)¹

**Курсовое применение Форлакса научит
кишечник работать правильно, а эффект
«обучения» сохранится после окончания
курса лечения²**

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Форлакс®. <http://grls.rosminzdrav.ru/>

2. Бабаян М.Л. Коррекция функциональных запоров у детей // Журнал «Детская энтерология». 2011. том 8. № 4.

Информация по препарату предоставляется в соответствии с п.4 ст.74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для ознакомления о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов. Если Вы хотите сообщить о нежелательных явлениях, жалобе на препарат направляйте, пожалуйста, свои претензии лечащему врачу, в регуляторные органы или в Московское представительство компании «Ипсен Фарма»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, 19, тел: +7 (8) 495 258-54-00, факс: +7 (8) 495 258-54-01, pharmacoovigilance.russia@ipsen.com В нерабочие часы круглосуточные телефоны: 8 (916) 999-30-28 (для приема сообщений о нежелательных явлениях и претензиях на качество препарата компании Ипсен); 8 (800) 700-40-25 (служба медицинской информации по препаратам компании для специалистов здравоохранения).



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

RUS:PHL 08072015